

| ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm ² | 5 % |
| 2 | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm ² | 15 % |
| 3 | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu nad 10 cm ² | 25 % |
| 4 | Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně | do 80 % |
| 5 | Traumatická porucha lícního nervu | do 10 % |
| 6 | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami lehkého stupně | do 10 % |
| 7 | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami středního stupně | do 20 % |
| 8 | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami těžkého stupně | do 35 % |
| 9 | Ztráta celého nosu | 20 % |
| 10 | Úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna) | 10 % |
| 11 | Úplná ztráta chuti (pouze částečná není plněna) | 5 % |
| 12 | Úplná ztráta zraku na jednom oku | 25 % |
| 13 | Úplná ztráta zraku na druhém oku (Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém více než 75 % a na obou očích více než 100%. Výjimku činí trvalá poškození uvedená v bodech 15, 21,22, která se hodnotí I nad tuto hranici) | 75 % |
| 14 | Snížení zrakové ostrosti dle pomocné tabulky | |
| 15 | Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti | 5 % |
| 16 | Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole | do 20 % |
| 17 | Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hod. denně | 15 % |
| 18 | Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hod. denně | 18 % |
| 19 | Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky | 25 % |
| 20 | Traumatická porucha okohybných nervů, nebo porucha rovnováhy okohybných svalů | do 25 % |
| 21 | Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku | 5 % |
| 22 | Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích | 10 % |
| 23 | Ztráta jednoho boltce | 10 % |
| 24 | Ztráta obou boltců | 15 % |
| 25 | Nedoslychavost jednostranná lehkého stupně | 0 % |
| 26 | Nedoslychavost jednostranná středního stupně | do 5 % |
| 27 | Nedoslychavost jednostranná těžkého stupně | do 12 % |
| 28 | Nedoslychavost oboustranná lehkého stupně | do 10 % |
| 29 | Nedoslychavost oboustranná středního stupně | do 20 % |
| 30 | Nedoslychavost oboustranná těžkého stupně | do 35 % |
| 31 | Ztráta sluchu jednoho ucha | 15 % |
| 32 | Ztráta sluchu obou uší | 45 % |
| 33 | Porucha labyrintu jednostranná podle stupně | 10-20 % |
| 34 | Porucha labyrintu oboustranná podle stupně | 30-50 % |
| 35 | Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnotí ztráta hlasu dle bude 42) | 15 % |
| 36 | Zohyzdující jizvy v obličejové části hlavy | do 5 % |
| POŠKOZENÍ CHRUPU (ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM) | | |
| 37 | Ztráta jednoho zubu (hradí se pouze ztráta zubu větší než 50 %) | 1 % |
| 38 | Ztráta každého dalšího zubu | 1 % |
| 39 | Za ztrátu, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých zubních náhrad | 0 % |
| 40 | Za ztrátu vitality zubu | 0 % |
| ÚRAZY KRKU | | |
| 41 | Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně | do 15 % |
| 42 | Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního a těžkého stupně s částečnou ztrátou hlasu (Podle bodu 42 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 43-45) | do 60 % |
| 43 | Ztráta hlasu (afonie) | 25 % |
| 44 | Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy | 30 % |
| 45 | Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat podle bodu 42-44) | 50 % |

| ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 46 | Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyš.) lehkého stupně | do 10% |
| 47 | Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyš.) středního a těžkého stupně | do 30% |
| 48 | Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, jednostranně | 15-40% |
| 49 | Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, oboustranně (spirometrické vyš.) | 25-100% |
| 50 | Porucha srdeční a cévní (pouze po přímém poranění, klinicky ověřené, podle stupně poranění, vyš. EKG) | 10-100% |
| 51 | Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně | do 10% |
| 52 | Poúrazové zúžení jícnu středního až těžkého stupně | 11-50% |
| ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ | | |
| 53 | Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu | do 25% |
| 54 | Poškození funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy | do 80% |
| 55 | Ztráta sleziny | 15% |
| 56 | Nedomykavost řitních svěračů podle rozsahu | do 60% |
| 57 | Zúžení konečníku podle rozsahu | do 40% |
| ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ | | |
| 58 | Ztráta jedné ledviny | 20% |
| 59 | Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce, podle stupně poškození) | do 50% |
| 60 | Ztráta jednoho varlete | 10% |
| 61 | Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let (ověřeno phalloplethysmografi í) | 35% |
| 62 | Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46 - 60 let (ověřeno phalloplethysmografi í) | 20% |
| 63 | Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let (ověřeno phalloplethysmografi í) | 10% |
| 64 | Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let | 40% |
| 65 | Ztráta pyje nebo závažné deformity od 46 let do 60 let | 20% |
| 66 | Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let (Je-li hodnoceno podle bodů 64-66, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 61-63) | 10% |
| 67 | Poúrazové deformity ženských pohlavních orgánů | 10-50% |
| ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY | | |
| 68 | Omezení hybnosti páteře lehkého stupně | do 10% |
| 69 | Omezení hybnosti páteře středního stupně | do 25% |
| 70 | Omezení hybnosti páteře těžkého stupně | do 55% |
| 71 | Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně | 10-25% |
| 72 | Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně | 26-40% |
| 73 | Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně | 41-100% |
| ÚRAZY PÁNVE | | |
| 74 | Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let | 30-65% |
| 75 | Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen po 45 letech | 15-50% |
| 76 | Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů | 15-50% |
| ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN | | |
| Níže uvedené hodnocení se vztahuje na pravoruké, u levorukých platí hodnocení opačné.vlevo nedominantní horní končetiny. | | |
| Poškození oblasti ramene a paže | | |
| 77 | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vpravo | 70% |
| 78 | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vlevo | 60% |
| 79 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vpravo | 35% |
| 80 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vlevo | 30% |
| 81 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st. fl exe 40-45 st, vnitřní rotace 20 st.) vpravo | 30% |
| 82 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st., fl exe 40-45 st, vnitřní rotace 20 st.) vlevo | 25% |
| 83 | Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vpravo | 5% |
| 84 | Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vlevo | 4% |
| 85 | Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vpravo | 10% |
| 86 | Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vlevo | 8% |
| 87 | Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vpravo | 18% |
| 88 | Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vlevo | 15% |
| 89 | Habituaální posttraumatická luxace ramenního kloubu vpravo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena) | 20% |
| 90 | Habituaální posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo (více jak 3x lékařem reponované, luxace RTG ověřena) | 16,5% |
| 91 | Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vpravo | 3% |
| 92 | Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vlevo | 2,5% |
| 93 | Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo (Tossy II a III) | 6% |
| 94 | Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo (Tossy II a III) | 5% |
| 95 | Pakloub kosti pažní vpravo | 35% |
| 96 | Pakloub kosti pažní vlevo | 30% |
| 97 | Chronický zánět kostní dřene pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu vpravo | 30% |
| 98 | Chronický zánět kostní dřene pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčbě následků úrazu vlevo | 25% |
| 99 | Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vpravo | 3% |
| 100 | Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vlevo | |

| Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 101 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízka) vpravo | 30 % |
| 102 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízka) vlevo | 25 % |
| 103 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vpravo | 20 % |
| 104 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vlevo | 16 % |
| 105 | Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo | do 18 % |
| 106 | Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo | do 15 % |
| 107 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo | 20 % |
| 108 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo | 16 % |
| 109 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vpravo | do 20 % |
| 110 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vlevo | do 16 % |
| 111 | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vpravo | do 20 % |
| 112 | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vlevo | do 16 % |
| 113 | Pakloub obou kostí předloktí vpravo | 40 % |
| 114 | Pakloub obou kostí předloktí vlevo | 35 % |
| 115 | Pakloub kostí vřetenní vpravo | 30 % |
| 116 | Pakloub kostí vřetenní vlevo | 25 % |
| 117 | Pakloub kosti loketní vpravo | 20 % |
| 118 | Pakloub kosti loketní vlevo | 15 % |
| 119 | Viklavý loketní kloub vpravo | do 20 % |
| 120 | Viklavý loketní kloub vlevo | do 15 % |
| 121 | Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vpravo | 55 % |
| 122 | Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vlevo | 45 % |
| 123 | Chronický zánět kostní dřene kostí předloktí vpravo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) | 27 % |
| 124 | Chronický zánět kostní dřene kostí předloktí vlevo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) | 22 % |
| Ztráta nebo poškození ruky | | |
| 125 | Ztráta ruky v zápěstí vpravo | 50 % |
| 126 | Ztráta ruky v zápěstí vlevo | 42 % |
| 127 | Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vpravo | 50 % |
| 128 | Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vlevo | 42 % |
| 129 | Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vpravo | 45 % |
| 130 | Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vlevo | 40 % |
| 131 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vpravo | 30 % |
| 132 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vlevo | 25 % |
| 133 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vpravo | 15 % |
| 134 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vlevo | 12,5 % |
| 135 | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vpravo | 20 % |
| 136 | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vlevo | 17 % |
| 137 | Pakloub člunkové kosti vpravo | 15 % |
| 138 | Pakloub člunkové kosti vlevo | 12 % |
| 139 | Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo | do 20 % |
| 140 | Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo | do 17 % |
| 141 | Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.) | do 12 % |
| 142 | Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.) | do 10 % |
| Poškození palce | | |
| 143 | Ztráta koncového článku palce vpravo | 9 % |
| 144 | Ztráta koncového článku palce vlevo | 7 % |
| 145 | Ztráta palce se záprstní kostí vpravo | 25 % |
| 146 | Ztráta palce se záprstní kostí vlevo | 21 % |
| 147 | Ztráta obou článků palce vpravo | 18 % |
| 148 | Ztráta obou článků palce vlevo | 15 % |
| 149 | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo | 8 % |
| 150 | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo | 7 % |
| 151 | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo | 7 % |
| 152 | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo | 6 % |
| 153 | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo | 6 % |
| 154 | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo | 5 % |
| 155 | Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo | 6 % |
| 156 | Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo | 5 % |
| 157 | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo | 9 % |
| 158 | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo | 7,5 % |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 159 | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vpravo | 6 % |
| 160 | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vlevo | 5 % |
| 161 | Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo | do 25 % |
| 162 | Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo | do 21 % |
| 163 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu vpravo | do 6 % |
| 164 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlankového kloubu vlevo | do 5 % |
| 165 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vpravo | do 9 % |
| 166 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu vlevo | do 7,5 % |
| Poškození ukazováku | | |
| 167 | Ztráta koncového článku ukazováku vpravo | 5 % |
| 168 | Ztráta koncového článku ukazováku vlevo | 4 % |
| 169 | Ztráta dvou článků ukazováku vpravo | 8 % |
| 170 | Ztráta dvou článků ukazováku vlevo | 6 % |
| 171 | Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo | 12 % |
| 172 | Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo | 10 % |
| 173 | Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo | 15 % |
| 174 | Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo | 12 % |
| 175 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vpravo | 15 % |
| 176 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vlevo | 12 % |
| 177 | Porucha úchopové funkce ukazováku vpravo | do 10 % |
| 178 | Porucha úchopové funkce ukazováku vlevo | do 8 % |
| 179 | Nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku vpravo, při neporušené úchopové funkci | 1,5 % |
| 180 | Nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku vlevo, při neporušené úchopové funkci | 1 % |
| 181 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo | 2,5 % |
| 182 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo | 2 % |
| Poškození prostředníku, prsteníku a malíku | | |
| 183 | Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo | 9 % |
| 184 | Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo | 7 % |
| 185 | Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vpravo | 8 % |
| 186 | Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vlevo | 6 % |
| 187 | Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vpravo | 5 % |
| 188 | Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vlevo | 4 % |
| 189 | Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vpravo | 3 % |
| 190 | Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vlevo | 2 % |
| 191 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) vpravo | 9 % |
| 192 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) vlevo | 7 % |
| 193 | Porucha úchopové funkce prstu (omezení fl exe do dlaně) vpravo | do 8 % |
| 194 | Porucha úchopové funkce prstu (omezení fl exe do dlaně) vlevo | do 6 % |
| 195 | Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlankových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo, vpravo | 1 % |
| 196 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo | 1,5 % |
| 197 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo | 1 % |
| Traumatické poruchy nervů horní končetiny | | |
| V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické | | |
| 198 | Traumatická porucha nervu axilárního vpravo | do 30 % |
| 199 | Traumatická porucha nervu axilárního vlevo | do 25 % |
| 200 | Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vpravo | do 45 % |
| 201 | Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vlevo | do 37 % |
| 202 | Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vpravo | do 35 % |
| 203 | Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vlevo | do 27 % |
| 204 | Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo | do 30 % |
| 205 | Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo | do 20 % |
| 206 | Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo | do 40 % |
| 207 | Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo | do 33 % |
| 208 | Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů vpravo | do 30 % |
| 209 | Traumatická porucha distální části loketního kloubu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vlevo | do 25 % |
| 210 | Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo | do 30 % |
| 211 | Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo | do 25 % |
| 212 | Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vpravo | do 15 % |
| 213 | Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vlevo | 12 % |
| 214 | Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vpravo | do 60 % |
| 215 | Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě i celé pleteně pažní vlevo | do 50 % |

| ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Poškození kyčle, stehna a kolene | | |
| 216 | Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezikyčelním a kolenním kloubem | 50% |
| 217 | Pakloub stehenní kosti nebo nektróza hlavice | 40% |
| 218 | Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) | 15% |
| 219 | Chronický zánět kostní dřené kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu | 25% |
| 220 | Zkrácení jedné dolní končetiny do 1 cm | 0% |
| 221 | Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm | do 5% |
| 222 | Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm | do 15% |
| 223 | Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm | do 25% |
| 224 | Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené) s odchylkou osovou nebo rotační, za každých celých 5° odchylky (prokázané RTG) | 5% |
| | Odchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. | |
| 225 | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká) | 40% |
| 226 | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení od základního postavení nebo nepatrné ohnutí) | 30% |
| 227 | Omezení pohyblivosti kyč. kloubu lehkého stupně | do 10% |
| 228 | Omezení pohyblivosti kyč. kloubu středního stupně | do 20% |
| 229 | Omezení pohyblivosti kyč. kloubu těžkého stupně | do 30% |
| Poškození kolena | | |
| 230 | Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí v úhlu 20° a větším) | 30% |
| 231 | Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí v úhlu 30° a větším) | 45% |
| 232 | Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení (úhel ohnutí do úhlu 20°) | do 30% |
| 233 | Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) | 15% |
| 234 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně | do 10% |
| 235 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně | do 15% |
| 236 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně | do 25% |
| 237 | Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazy | 5% |
| 238 | Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního nebo zadního zkříženého vazy | do 15% |
| 239 | Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního a zadního zkříženého vazy | do 25% |
| 240 | Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části -minimálně 1/3 menisku průkaz operačním nálezem) | do 5% |
| 241 | Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků | |
| 242 | Trvalé následky po vynětí česky včetně atrofie e stehenních a lýtkových svalů | do 10% |
| Poškození bérce | | |
| 243 | Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem | 45% |
| 244 | Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem | 50% |
| 245 | Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce | 30% |
| 246 | Chronický zánět kostní dřené kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu | 22% |
| 247 | Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotační odchylce (odchylky musí být prokázány na RTG), za každých celých 5° | 5% |
| | Odchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. | |
| Poškození v oblasti hlezenného kloubu | | |
| 248 | Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním | 40% |
| 249 | Ztráta chodidla v Chopartově kloubu | 30% |
| 250 | Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním | 25% |
| 251 | Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorzální fl exe nebo plantární fl exe nad 20°) | 30% |
| 252 | Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravouhlém postavení | 25% |
| 253 | Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°) | 20% |
| 254 | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně | do 6% |
| 255 | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně | do 12% |
| 256 | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně | do 20% |
| 257 | Omezení pronace a supinace nohy | do 12% |
| 258 | Úplná ztráta pronace a supinace nohy | 15% |
| 259 | Viklavost hlezenného kloubu (nutný průkaz RTG nebo USG) | do 20% |
| 260 | Plochá nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy | do 25% |
| 261 | Chronický zánět kostní dřené v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní, jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu | 15% |
| Poškození v oblasti nohy | | |
| 262 | Ztráta všech prstů nohy | 15% |
| 263 | Ztráta obou článků palce nohy | 10% |
| 264 | Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí | 15% |
| 265 | Ztráta koncového článku palce nohy | 3% |
| 266 | Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst | 2% |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 267 | Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí | 10% |
| 268 | Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce nohy | 3% |
| 269 | Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy | 7% |
| 270 | Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy | 8% |
| 271 | Omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu palce nohy | do 3% |
| 272 | Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy | do 7% |
| 273 | Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst | 1% |
| 274 | Poúrazové oběhové a trojčké poruchy na jedné dolní končetině | do 15% |
| 275 | Poúrazové oběhové a trojčké poruchy na obou dolních končetinách | do 30% |
| 276 | Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na stehně | 5% |
| 277 | Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na bérce | 3% |
| Traumatické poruchy nervů dolní končetiny | | |
| V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trojčké | | |
| 278 | Traumatická porucha nervu sedacího | do 50% |
| 279 | Traumatická porucha nervu stehenního | do 30% |
| 280 | Traumatická porucha nervu obturatorního | do 20% |
| 281 | Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů | do 35% |
| 282 | Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů | do 5% |
| 283 | Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů | do 30% |
| 284 | Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového | do 20% |
| 285 | Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového | do 10% |
| OSTATNÍ DRUHY TRVALÝCH NÁSLEDKŮ | | |
| 286 | Jizvy a deformity (kromě bodu 36 těchto tabulek), které nezanechají funkční poškození | nehradí se |
| 287 | Poúrazové pigmentační změny | nehradí se |
| 288 | Poúrazové bolesti bez funkčního poškození | nehradí se |
| 289 | Duševní poruchy způsobené úrazem | nehradí se |

Trvalé následky úrazu v oceňovací tabulce neobsažené stanoví likvidátor ve spolupráci s posudkovým lékařem pojišťovny na základě srovnání stupně závažnosti.

Pomocná tabulka pro hodnocení stupně poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

| Vizus | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/36 | 6/60 | 3/60 |
|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 6/6 | 0% | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 25% |
| 6/9 | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 28% |
| 6/12 | 4% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 25% | 31% |
| 6/15 | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 25% | 29% | 35% |
| 6/18 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 25% | 29% | 33% | 39% |
| 6/24 | 12% | 15% | 18% | 21% | 25% | 29% | 33% | 38% | 44% |
| 6/36 | 15% | 18% | 21% | 25% | 29% | 33% | 38% | 43% | 49% |
| 6/60 | 18% | 21% | 25% | 29% | 33% | 38% | 43% | 49% | 55% |
| 3/60 | 25% | 28% | 31% | 35% | 39% | 44% | 49% | 55% | 65% |